

# くすりのしおり

外用剤

2024年04月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

## 製品名：亜鉛華軟膏＜ハチ＞

主成分：酸化亜鉛（Zinc oxide）

剤形：白色の軟膏剤

シート記載など：



## この薬の作用と効果について

収れん、消炎、保護、緩和な防腐作用により、皮膚疾患を改善します。

通常、外傷、熱傷（やけど）、凍傷、湿疹・皮膚炎、肛門そう痒症、白癬（水虫）、面皰（にきび）、せつ（おでき）、よう（せつがつながったもの）、その他の皮膚疾患によるびらん（ただれ）・潰瘍・湿潤面に用いられます。

## 次のような方は注意が必要な場合があります。必ず担当の医師や薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

## 用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・通常、症状に応じ1日1～数回、患部に塗擦または貼布します。必ず指示された使用方法に従ってください。
- ・重度または広範囲のやけどや、眼には使用しないでください。
- ・使い忘れた場合は、気がついた時に1回分を使用してください。ただし、次に使用する時間が近い時は1回とばして、次の通常の使用時間に1回分を使用してください。2回分を一度に使用してはいけません。
- ・誤って多く使用した場合は、医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、使用を止めないでください。

## 生活上の注意

## この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、過敏症状、発疹、刺激感などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

## 保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄方法がわからない場合は受け取った薬局や医療機関に相談してください。他の人に渡さないでください。

## 医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療関係者向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。