

## くすりのしおり

620000583

2007年2月作成

<p>薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。</p>	
<p><b>商品名：タンニン酸アルブミン〈ハチ〉</b> 主成分：タンニン酸アルブミン（Albumin tannate） 剤形：淡褐色の粉末 シート記載：</p>	
<p><b>この薬の作用と効果について</b> 下痢の症状を改善します。</p>	
<p><b>次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。</li><li>・ 妊娠または授乳中</li><li>・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。</li></ul>	
<p><b>用法・用量（この薬の使い方）</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ <b>あなたの用法・用量は</b> <span style="float: right;">：医療担当者記入</span></li><li>・ 通常、成人は1日3～4g（主成分として3～4g）を3～4回に分けて服用します。服用時はコップ1杯の水またはぬるま湯と一緒に服用してください。治療を受ける疾患や年齢・症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。</li><li>・ 飲み忘れた場合は、気がついたときに1回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は飲まないでいき、次に飲む時間から飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。</li><li>・ 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。</li><li>・ 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。</li></ul>	
<p><b>生活上の注意</b></p>	
<p><b>この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）</b> 主な副作用として、便秘になる、食欲不振になる、また長期にわたり大量に服用した場合は全身がだるい、吐き気がする、皮膚や白目が黄色くなるなどが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。</p> <p><b>まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。</b> <b>このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 息苦しい、かゆみを伴った発赤、めまいがする。[ショック、アナフィラキシー様症状]</li></ul> <p><b>以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。</b></p>	
<p><b>保管方法その他</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。</li><li>・ 薬が残った場合、保管しないで薬局や医療機関に相談してください。</li></ul>	
<p><b>医療担当者記入欄</b>      年    月    日</p>	

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。