

# くすりのしおり

外用剤

2024年04月改訂


薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

## 製品名: 含嗽用ハチアズレ顆粒

主成分: アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 (Sodium gualenate hydrate)  
炭酸水素ナトリウム (Sodium bicarbonate)

剤形: 淡青紫色の顆粒剤

シート記載など: 含嗽用ハチアズレ顆粒、うがい薬、2g、のまないこと



## この薬の作用と効果について

抗炎症作用、ヒスタミン遊離抑制作用、上皮形成促進作用により、口の中や喉の痛みや腫れを和らげます。通常、咽頭炎、扁桃炎、口内炎、急性歯肉炎、舌炎、口腔創傷の治療に用いられます。

## 次のような方は注意が必要な場合があります。必ず担当の医師や薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。最近、歯を抜いたことがある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

## 用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・通常、1回1包2gを、適量（約100mL）の水またはぬるま湯に溶かして、1日数回うがいをしますが、年齢・症状により適宜増減されます。必ず指示された使用方法に従ってください。
- ・うがいを忘れた場合は、気がついた時にうがいしてください。2回分を一度に使用してはいけません。
- ・誤って飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、うがいを止めないでください。

## 生活上の注意

### この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、口や喉の刺激感、口中のあれなどが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

## 保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、光、湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄方法がわからない場合は受け取った薬局や医療機関に相談してください。他の人に渡さないでください。

## 医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療関係者向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。