

# くすりのしおり

内服剤

2019年12月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

## 商品名：コデインリン酸塩散 1%＜ハチ＞

主成分：コデインリン酸塩水和物 (Codeine phosphate hydrate)

剤形：白色～微帯黄白色の散剤

シート記載：



## この薬の作用と効果について

中枢神経をおさえ、咳をしずめたり、痛みをおさえます。腸管ぜん動運動をおさえます。通常、呼吸器の病気による咳をしずめたり、痛みを取りのぞいたり、激しい下痢の症状を改善することに用いられます。

## 次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。呼吸抑制、気管支喘息発作、肝障害、心不全、けいれん、急性アルコール中毒、出血性大腸炎がある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

## 用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・通常、成人は1回2g（主成分として20mg）、1日6g（60mg）を服用します。治療を受ける疾患や年齢・症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・飲み忘れた場合は、気がついたときに1回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は飲まないでいき、次に飲む時間から飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

## 生活上の注意

- ・眠気、めまいが起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作は避けてください。アルコールはこの薬の副作用を増強する可能性がありますので、服用中は控えてください。

## この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、不整脈、血圧変動、顔面潮紅、眠気、めまい、視調節障害、発汗、吐き気、嘔吐、便秘、発疹、かゆみ、排尿障害などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・薬がないといられない、薬を中止すると手足がふるえる、不眠、不安、けいれん、幻覚などを起こす〔依存性〕
- ・息苦しい、息切れがする〔呼吸抑制〕
- ・意識が乱れる、めまいがする、考えがまとまらない〔錯乱〕
- ・胸が痛む、息をするときヒューヒュー音がする、唇や手足のつめが青くなる〔無気肺、気管支けいれん、喉頭浮腫〕
- ・激しい腹痛、吐き気がする、お腹がはる〔麻痺性イレウス、中毒性巨大結腸〕

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

## 保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については受け取った薬局や医療機関に相談してください。

## 医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。