

くすりのしおり

660431059

2009年9月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：フェノール・亜鉛華リニメント〈ハチ〉

主成分：液状フェノール（Liquified phenol）
トラガント末（Powdered tragacanth）
カルメロースナトリウム（Carmelose calcium）
グリセリン（Glycerin）
酸化亜鉛（Zinc oxide）

剤形：白色ののり状のリニメント剤

シート記載：

**この薬の作用と効果について**

亜鉛による収斂・消炎・保護・防腐作用と、フェノールによる鎮痛・防腐・鎮痒作用を示します。通常、皮膚そう痒症、あせも、じんま疹、虫さされの治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- ・ 妊娠または授乳中
- ・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・ **あなたの用法・用量は** ：医療担当者記入 **〈 〉**
- ・ 通常、1日1～数回適量を患部に塗りますが、治療を受ける疾患や症状により適宜増減されます。必ず指示された使用方法に従ってください。
- ・ びらん・潰瘍・かさぶた・傷のある皮膚および粘膜、眼には使用しないでください。
- ・ 使用し忘れた場合は、気が付いた時に1回分を使用してください。2回分を一度に使用しないでください。
- ・ 誤って多く使用した場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・ 医師の指示なしに、自分の判断で使用するのを止めないでください。
- ・ 眼には使用しないでください。また、長時間または広範囲の使用は避けてください。

生活上の注意**この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）**

主な副作用として、過敏症状、発疹、刺激感などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[] 内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法その他

- ・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄 年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。